

Datasheet



Régulateur de
croissance des
plantes
Foliaire



VEKON

COMPOSITION

%p/v

CPPU (Forchlorfenuron)

1,0

CHARACTERISTICS

VEKON est un régulateur physiologique de croissance des plantes, formulé sous forme de solution liquide à 1,0 % de forchlorfenuron (CPPU). Il agit comme une cytokinine synthétique hautement active, stimulant la division cellulaire dans les tissus végétaux et favorisant l'élongation des fruits. Son mode d'action se traduit par une augmentation du nombre de cellules par fruit et une croissance plus rapide, ce qui donne des fruits plus gros, plus lourds et plus volumineux. Appliqué aux stades clés du développement des fruits, VEKON favorise un grossissement uniforme des fruits sans provoquer de déséquilibres significatifs au niveau de la plante, ce qui se traduit par des récoltes à haut rendement et une meilleure qualité commerciale.

ACTIONS



AUGMENTE LE RENDEMENT
TOTAL DES CULTURES ET
AMÉLIORE L'UNIFORMITÉ ET
LA QUALITÉ COMMERCIALE



STIMULE LA
DIVISION
CELLULAIRE ET
L'ALLONGEMENT
DES FRUITS



FAVORISE LA
CROISSANCE DES
FRUITS À DES
STADES CLÉS DE
DÉVELOPPEMENT



APPLICATION FOLIAIRE

CULTURE	DOSE (PPM) ML/100 L D'EAU	APPLICATION
Tomate	1	Pour améliorer la conformation des plants : au début du développement végétatif. Pour améliorer le poids, la taille et l'homogénéité des fruits : au début de la floraison et de la nouaison ; répéter après chaque coupe (21 jours pour les tomates finies).
Citrouille, melon, pastèque	1	Pour améliorer le développement précoce de la vigne : dès la formation de 3 à 5 vraies feuilles. Pour favoriser la nouaison : au début de la floraison femelle. Pour améliorer le poids, la taille et l'homogénéité des fruits : répéter l'opération tous les 5 à 10 jours par la suite.
Concombre	0,5	Pour améliorer la nouaison : dès l'apparition des premières fleurs, répéter l'opération après 7 jours. Améliorer la taille, l'homogénéité et le poids des fruits : tous les 5 à 10 jours dès l'apparition des jeunes fruits.
Oignon	0,5	Pour améliorer la taille, la forme et l'uniformité du bulbe : appliquer sur la deuxième paire de vraies feuilles.
Arbres fruitiers à feuilles caduques (pommiers, pêchers, poiriers, pruniers et cerisiers)	0,5	Pour augmenter la nouaison, améliorer la taille et la forme des fruits : appliquer dès la nouaison ; répéter 15 jours plus tard.
Agrumes (orange, citron de Perse, pamplemousse, mandarine, citron mexicain) et mangues	1	Pour une floraison uniforme et une fructification optimale : 15 jours avant la floraison. Répéter à la chute des pétales et lorsque les fruits atteignent la taille d'une bille.
Mûre	1	Au débourrement. Au début de la floraison et de la nouaison (avec un intervalle de sécurité de 8 jours).
Fraises	1	Pendant la formation de la couronne. Au début de la floraison et de la nouaison (avec un intervalle de sécurité de 8 jours).

CROPS	DOSE (PPM) ML/100 L OF WATER	APPLICATION PERIOD
raisin de table	4	Pour améliorer l'uniformité de la germination et la vigueur des pousses, ainsi que la structure des grappes selon la variété (Perlette, Flame, Thompson et Superior) : du point vert jusqu'aux pousses de 15 cm.
Anana	2	Pour améliorer la forme et le poids du fruit : séchage des pétales du dernier tiers du fruit.
Plantes ornementales (roses, chrysanthèmes, œillets et poinsettias)	0,5	Pour induire le débourrement latéral : au début du débourrement ou après. En cas de doute sur le poids et la longévité des espèces produites en grappes : juste après l'éclosion de la fleur apicale.
Pomme de terre	1	Pour améliorer la germination, appliquer 1 cc au moment de la plantation. Pour les stolons, appliquer 1,5 cc sur les feuilles au début de ce stade phénologique et répéter 15 jours plus tard.

COMPATIBILITÉ

La formulation VEKON est compatible avec la plupart des engrais foliaires et produits phytosanitaires à réaction neutre ou légèrement acide. Il est recommandé d'éviter tout mélange avec des produits à réaction fortement alcaline ou d'autres régulateurs de croissance afin de ne pas réduire l'efficacité du forchlorfenuron ou de générer des interactions indésirables. En cas de doute, effectuer un test de compatibilité à petite échelle avant le mélange dans la cuve d'application. Maintenir une agitation constante de la bouillie lors de la préparation des mélanges.

STOCKAGE

Conservé le produit dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur. Conserver à une température comprise entre 0 °C et 40 °C pour préserver la stabilité de la formule. Dans des conditions de stockage appropriées, VEKON conserve son efficacité pendant au moins deux ans à compter de la date de fabrication. Tenir hors de portée des enfants, des animaux domestiques et des personnes non autorisées. Éviter de stocker à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de sources d'eau potable.

REGULATEUR DE CROISSANCE

tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
Bouteille en plastique de
100cc - 250cc - 500cc -1L



IMPORTÉ
DE L'UE

