



acide aminé
Foliaire/Sol



Engrais liquide à haute
concentration en acides aminés

SOWY

COMPOSITION

	%p/p
Acides aminés totaux	28
Acides aminés libres	25
Azote total	5
Azote organique	4
Inducteur de défense (ID)	3

- ORIGINE VÉGÉTALE
- ACTIVITÉ BIOSTIMULANTE
- EFFET ANTISTRESS

CARACTÉRISTIQUES

SOWY est un produit d'origine naturelle, à haute teneur en acides aminés libres, dérivés de matières végétales. Composé d'acides aminés que la plante utilise pour satisfaire ses besoins en protéines, avec une importante économie d'énergie, agissant comme un biostimulant efficace pendant les phases d'enracinement, de germination, de floraison, de nouaison et de développement des fruits.

APPLICATION

CULTURE	DOSAGE DU SOL	Lts/ha
Fraises	Tous les 10 jours après le repiquage.	4
Arbres fruitiers	Du bourgeonnement jusqu'au gonflement du fruit.	6
Plants de bananiers	Tous les 15 jours entre mars et juin.	6
Oliviers	Tout au long du cycle.	18
Raisins de table	Du bourgeonnement jusqu'à la fin du cycle.	5
Fruits secs	Du bourgeonnement jusqu'au gonflement du fruit.	5
Agrumes	De la floraison jusqu'au gonflement du fruit.	12
Coton	10 jours après la pousse jusqu'à 20 jours après la floraison.	6
Plantes ornementales	Tous les 15 jours après le repiquage.	4

ACTIONS

✓	PRODUCTIVITÉ ACCRUE
✓	FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT RADICULAIRE
✓	AMÉLIORE L'ABSORPTION ET LE TRANSPORT DES NUTRIMENTS
✓	INDUIT UNE MEILLEURE POLLINISATION ET FLORAISON
✓	BONNE GERMER
✓	FRUITS DE PLUS GRANDE QUALITÉ

CULTURE	DOSAGE FOLIAIRE	cc/100L
Horticole	Tous les 10 jours après le repiquage.	200
Fraises	Tout au long du cycle.	200
Tubercules	Tous les 15 jours.	250
Arbres fruitiers	Du bourgeonnement jusqu'au gonflement du fruit.	200-300
Bananiers	Tous les 15 jours.	250
Oliviers	Tout au long du cycle.	200-300
Raisins de table	Du bourgeonnement jusqu'à la fin du cycle.	250
Raisins de cuve	Du bourgeonnement jusqu'à la fin du cycle.	2 L/Ha
Fruits secs	Du bourgeonnement jusqu'au gonflement du fruit.	200-300
Agrumes	De la floraison jusqu'au gonflement du fruit.	200-300
Betterave	2 applications tous les 15 jours.	2,5 L/Ha
Coton	10 jours après la germination jusqu'à 20 jours après la première fleur..	300
Luzerne	Après chaque tonte.	2,5 L/Ha
Plantes ornementales	Tous les 15 jours après le repiquage.	250
Pelouse	Après semis/Phase de croissance.	3-5 L/Ha/ 30 cc/m2

