



Acide aminé
Foliaire / Sol

SOWY Solid

COMPOSITION

%p/p

Acides aminés totaux
Acides aminés libres totaux
Azote total

90,00
85,00
14,50

Acides aminés libres solides

CARACTÉRISTIQUES

SOWY SOLID est un produit biostimulant composé d'acides aminés d'origine végétale obtenus par hydrolyse enzymatique de protéines naturelles. Il stimule les processus métaboliques essentiels d'une culture : enracinement, germination, floraison, nouaison et développement des fruits, en particulier lorsque des situations défavorables surviennent dans le processus de développement de la plante.

APPLICATION AU SOL

CULTURES	Application
Dans toutes les cultures	SAISON : Réduction du stress, amélioration de l'efficacité des traitements phytosanitaires. DOSAGE ANNUEL : 3-4 Kg/Ha en cas de stress (salinité, sécheresse, etc.) répartis en plusieurs doses (1 Kg/Ha)
Céréales, pommes de terre, légumineuses	SAISON : Augmentation du rendement. DOSAGE ANNUEL : 3-4 Kg/Ha répartis en 3 applications tous les 15 jours après le stade de la première vraie feuille
Arbres fruitiers horticoles	SAISON : Nouaison, croissance et qualité des fruits. DOSAGE ANNUEL : 1-2 Kg/Ha tous les 10-15 jours, depuis la préfloraison jusqu'au début de la coloration

ACTIONS

- AUGMENTER LA RÉSISTANCE AU STRESS (Température élevée, faible humidité, sécheresse, attaques de parasites, gel, inondation)
- SYNTHÈSE DES PROTÉINES
- AUGMENTE LA TENEUR EN CHLOROPHYLLE
- RÉGULE L'OUVERTURE STOMATIQUE
- AGENT CHELATANT POUR MICRONUTRIMENTS
- MATIÈRES PREMIÈRES HORMONES
- AIDE À LA POLLINISATION ET À LA NOUAISON DES FRUITS
- AUGMENTE L'ACTIVITÉ MICROBIENNE DU SOL

CULTURES	Application
Légumes de plein champ.	SAISON : Augmentation du rendement DOSAGE ANNUEL : 1-2 Kg/Ha tous les 7-10 jours après le stade de la première vraie feuille
Plantes ornementales et pépinière d'arbres, aménagement paysager, gazon (en général)	SAISON : Formation des racines et absorption des nutriments, qualité des feuilles en croissance, croissance DOSAGE ANNUEL : 1 Kg/Ha tous les 7-12 jours à partir de la plantation
Légumes sous serre	SAISON : Rendement, qualité des feuilles qui poussent, croissance DOSAGE ANNUEL : 3-4 Kg/Ha répartis en 2-3 applications tous les 10-15 jours, à partir de la plantation

La concentration recommandée pour l'application foliaire est de 0,3-0,5% dans la quantité habituelle d'eau de pulvérisation.

