



Biorégulateur Foliaire



FIX

COMPOSITION

	%p/v
Potassium (K ₂ O)	17,0
Phosphore (P ₂ O ₅)	11,0
Extrait d'algues	10,0
Molybdène (Mo)	4,0
Bore (B)	3,0
Manitol	0,24
Densité : 1,34 g/cc	

- **ORIGINE VÉGÉTALE**
- **CONTIENT DE L'EXTRAIT D'ALGUES**
- **AFFECTE LA FLORAISON ET LA NOUTURE DES FRUITS**

Inducteur de floraison et de nouaison

CARACTÉRISTIQUES

FIX est un produit innovant, conçu par TANGEL AGRO, avec une action de biorégulateur. Il contient des nutriments et des composants organiques d'origine végétale. Tous favorisent les processus métaboliques de la culture qui fournissent de l'énergie à la plante. Il améliore la floraison et la nouaison de différentes cultures.

FIX est un engrais riche en phosphore, potassium, micronutriments (bore et molybdène) et algues (extrait d'*Ascophyllum nodosum*), conçu pour stimuler les plantes pendant les processus les plus critiques de leur phase générative : formation des fleurs et nouaison des fruits.

FIX réactive les processus cellulaires qui favorisent l'amarrage des fruits, évitant ainsi leur chute. Dans l'élaboration de **FIX**, des processus sont utilisés qui maintiennent tous les composants actifs solubles, pour une absorption immédiate par la plante.

ACTIONS

- AUGMENTE LA TAILLE ET L'UNIFORMITÉ DES FRUITS
- AUGMENTE LA PRODUCTION COMMERCIALE ET RÉDUIT LA PERTE DE FRUITS
- ÉVITER LA CHUTE PRÉMATURÉE DES FRUITS
- AUGMENTE LA QUALITÉ DU POLLEN
- STIMULE LA NOUAISON DES FRUITS

Cultures

Taux par application (foliaire*) Stades et recommandations

ARBRES FRUITIERS	3 - 4 l/ha / 3-4 traitements à partir de la nouaison tous les 10-15 jours
Fruit à noyau	3,5 - 4,5 l/ha / 1ère application : dès le durcissement des noyaux 2ème application : 8-10 jours après le 1er traitement 3ème application : 8-10 jours après le 2ème traitement
Pomme	3,5 - 4,5 l/ha / A partir de 20 mm de taille de fruit 3-4 traitements tous les 12-15 jours BBCH 71-72.
Poire	3,5 - 4,5 l/ha / A partir de fruits de 20 mm, 3-4 traitements tous les 12-15 jours.
Kiwi	4,0 - 4,5 l/ha / 1ère application : après la nouaison 2ème application : 15 - 20 jours après le 1er traitement 3ème application : 15 - 20 jours après le 2ème traitement 4ème application : 30 jours après le 3ème traitement.
Clémentine, Mandarine	3,5 - 4,5 l/ha / De 15 à 20 mm de taille de fruit 3 traitements tous les 15 à 18 jours.
RAISIN DE TABLE	3,5 - 4,5 l/ha / Augmentation du calibre des fruits : 1ère application : baie de calibre 8-10 mm 2ème application : baie de calibre 15-16 mm 3ème application : véraison. Allongement du rachis : 1ère application : inflorescences bien visibles BBCH 53 2ème application : avant la floraison BBCH 57 3ème application : après la floraison BBCH 73.
VIGNE	3,5 - 4,5 l/ha / Augmentation de la taille des fruits : 1ère application : après la nouaison 2 à 3 traitements tous les 10 à 15 jours.
OLIVIERS	3,5 - 4,5 l/ha / A partir de la lignification des pierres : 2 traitements également avec des traitements agrochimiques.
LÉGUMES	3,5 - 4,5 l/ha / 3-4 traitements à partir de la nouaison tous les 10-15 jours.
FRAISES ET PETITS FRUITS	3,5 - 4,5 l/ha / 3-4 traitements à partir de la nouaison tous les 10-15 jours.

*Utiliser le produit à une concentration de 3-5%.

FLORAISON ET NOUTURE

tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
1L - 5L - 20L
Bouteille en plastique



IMPORTÉ
DE L'UE

