

Datasheet



Régulateur de
croissance des plantes
Sol / Foliaire



GIB PLUS

COMPOSITION

%p/p

Gibbérellines	3,00
Azote total (N)	23,00
Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	12,00
Zinc (Zn)	10,00
Acides Fulviques	1,50

Régulateur de croissance des plantes

CARACTÉRISTIQUES

GIB PLUS est un produit hormonal conçu pour stimuler le développement des plantes. Formulée avec une teneur élevée en acide gibbérellique et enrichie en éléments agissant en synergie avec cette hormone : azote, potassium et zinc. Sa formulation active rapidement la croissance des bourgeons axillaires et contribue à surmonter les périodes de stress environnemental dès les premiers stades de développement.

La composition de ses trois tensioactifs favorise considérablement la dispersion des molécules d'eau, améliorant ainsi leur mobilité dans le sol et la vitesse d'infiltration.

Les acides fulviques contenus dans GIB PLUS favorisent la formation d'agrégats dans le sol, favorisant ainsi les espaces poreux entre les particules, améliorant ainsi la mobilité et la disponibilité de l'eau, ainsi que celle des nutriments présents dans le sol.

APPLICATION

Cultures	Dosage (L/Ha)	Étapes de candidature
Luzerne	500g à 1Kg/Ha	Appliquer après chaque coupe dès l'apparition des repousses.
Haricots, pois chiches, soja	500g à 1Kg/Ha	Appliquer en pleine floraison et au début de la croissance des gousses.
Céleri	500g à 1Kg/Ha	Pour augmenter la longueur des pétioles, appliquer quatre semaines avant la récolte.
Agrumes	3 à 4 kg/ha pour 1 000 L d'eau	Appliquer au début de la floraison et répéter 2 à 3 fois avec un intervalle de 3 semaines entre chaque application.
Coton	500g à 1Kg/Ha	Appliquer pendant la phase de floraison.
Cucurbitacées (pastèque, melon, concombre et citrouille)	500g à 1Kg/Ha	Appliquer au début de la fructification et répéter tous les 8 jours.
Maïs et sorgho	500g à 1Kg/Ha	Appliquer au stade de 4 à 6 feuilles développées.
Pomme de terre	1 à 2 kg/ha pour 1 000 l d'eau 200 g/100 l d'eau (4 ppm de gibbérellines)	Appliquer au moment du semis, arroser le tubercule. Appliquer en immersion.

ACTIONS

- ✓ AUGMENTE LE NOMBRE DE FRUITS, LA COULEUR ET LA TAILLE.
- ✓ ACCÉLÈRE LA GERMINATION DES BOURGEONS VÉGÉTATIFS.
- ✓ STIMULE LA FLORAISON.
- ✓ IL FAVORISE LA CROISSANCE DES ENTRE-NOEUDS.
- ✓ TENEUR ÉLEVÉE EN GIBBÉRELLINES
- ✓ HIGH EFFICIENCY
- ✓ ACTION SYNERGIQUE DES ACIDES FULVIQUES ET DU ZN

Cultures	Dosage (L/Ha)	Étapes de candidature
Fraises	1 à 2 kg/ha	Appliquer au début de la floraison et répéter à intervalles de 21 jours entre chaque application.
Canne à sucre	1Kg/Ha	Appliquer au moment de l'élongation de la tige.
Tomates	500g à 1Kg/Ha	Appliquer la troisième et la quatrième semaine après le repiquage et répéter au début du développement des fruits.
Tomates	500g à 1Kg/Ha	Appliquer la troisième et la quatrième semaine après le repiquage et répéter au début du développement des fruits.
Vid (variété sans pépins « Thompson Seedless Perlette »)	250 à 500 g/100 L d'eau 1 kg/100 L d'eau 500 g à 2 kg/100 L d'eau	Appliquer au stade d'éclaircissage des fleurs. Appliquer pour l'allongement des grappes.
Noyer	200 g/100 L d'eau 500 g/100 L d'eau 300 g/100 L d'eau 400 g/100 L d'eau	Appliquer sur les pointes vertes. Appliquer 8 jours plus tard. Appliquer 15 jours plus tard. Appliquer 21 jours plus tard.
		Pour les arbres en production, appliquez la 4e application. Pour les arbres en développement, appliquez les 3 premières applications.

REGULATEUR DE CROISSANCE

tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
0,5L - 1L - 5L - 10L - 20L
Bouteille en plastique

IMPORTÉ
DE L'UE