

Datasheet

MUMIC AMYN

COMPOSITION

%p/v

Extrait humique total	14,0
Acides humiques	14,0
Acides aminés libres	14,0
Polysaccharides	8,0
Densité : 1,15 g/cc	

Biostimulant
Foliar / Soil

- BIODISPONIBILITÉ
- HAUTEMENT SOLUBLE
- PETITE TAILLE DE PARTICULE
- STABILITÉ

Engrais liquide à haute concentration
en acides fulviques et acides aminés

CARACTÉRISTIQUES

MUMIC AMYN est un agent de croissance et d'amélioration du sol extrêmement bioactif sous forme liquide avec une concentration élevée d'acides fulviques naturels. Kulvic Aryn est 100% soluble dans l'eau et convient à toutes les cultures et jardins pour l'application sur le feuillage et le sol. Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec des engrais solubles et actuellement, des agents phytosanitaires.

MUMIC AMYN est un biostimulant naturel et polyvalent. Il est produit par un processus de fermentation bactérienne à partir de matières premières végétales.

MUMIC AMYN contient une gamme complexe de biostimulants du sol à base de plantes, notamment des phytohormones naturelles (cytokinines, auxines, gibbérellines), des polyamines, des antioxydants, des bêtaïnes, des peptides, des métabolites secondaires, des polysaccharides, des auxines, des vitamines, des glucides et des matières organiques pour améliorer la disponibilité des nutriments dans le sol, ce qui entraîne une absorption élevée dans les plantes.

APPLICATION

Foliaire : 200-300 ml/100 ml d'eau

Fertirrigation : Goutte à goutte : 5-10 L/ha

ACTIONS

- ✓ VIGUEUR OPTIMALE DES CULTURES
- ✓ AUGMENTE LA TOLÉRANCE AU STRESS
- ✓ FAVORISE LA CROISSANCE DES RACINES
- ✓ AMÉLIORE L'ABSORPTION ET LE TRANSPORT DES NUTRIMENTS
- ✓ AUGMENTE L'ACTIVITÉ MICROBIENNE DANS LE SOL
- ✓ RENDEMENT ET QUALITÉ

CULTURES	Saison and dose annuelle
Myrtilles et canneberges	10 L/ha Appliquer 3 fois : débourrement, nouaison et calibrage des fruits.
Céréales	Dose minimale : 4 L/ha en une seule fois. Peut être appliqué en mélange avec des herbicides. Dans les céréales d'été, appliquer 35 à 40 jours après le semis.
Légumes-fruit et fleurs coupées	4 à 6 applications dès le début de la culture, selon le stress et le développement.
Légume de serre	Appliquer tout au long du cycle de la culture tous les 7 à 14 jours ; par voie foliaire ou fertilisante.
Vergers, agrumes, plantes subtropicales et oliviers	Appliquer au débourrement, avant la floraison et une fois la nouaison terminée. Utiliser lorsque les cultures sont stressées.
Légumes	Cultures feuillues : Appliquer régulièrement au début de la croissance.
Vigne	Appliquer pendant la croissance végétative ; répéter 2 à 3 fois à partir de la nouaison des baies jusqu'au début de la maturation.

L'application foliaire renforce l'effet des insecticides et des fongicides. Pour des programmes spécifiques à certaines cultures, contactez notre support technique.

HUMIC ACIDS
tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

AVAILABLE IN
1L - 5L - 10L - 20L -
1000L Plastic Bottle/IBC

IMPORTÉ
DE L'UE