



**Biostimulant
Foliaire/Sol**

MUMIC SOLID

COMPOSITION

%w/w

Extrait humique total	85,0
Acides humiques	74,0
Acides fulviques	11,0
Potassium (K ₂ O)	11,0

Engrais solide à haute concentration
en acides humiques

CHARACTERISTICS

MUMIC SOLID est un produit solide soluble de Leonardite. Avec des valeurs élevées d'extrait humique total. Sa forme potassique confère une grande solubilité et une incorporation facile au système sol-plante. Mumic Solid incorpore des niveaux adéquats d'acides humiques et fulviques dans sa composition, ce qui le rend approprié comme biostimulant capable d'exercer une action importante sur la respiration cellulaire du végétal, ce qui se traduit par des actions importantes.

ACTIONS

RENDEMENT ET QUALITÉ

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE RÉTENTION D'EAU

AUGMENTATION DES MICROORGANISMES BÉNÉFIQUES DU SOL

MEILLEURE CAPACITÉ D'ÉCHANGE DE CATIONS DU SOL (CEC)

AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DES ENGRAIS

APPLICATION

Application au sol

Serre horticole (cultures horticoles, plantes ornementales...)
Pleins champs (cultures horticoles, pommes de terre...)

Arbres fruitiers (pommiers, agrumes, bananiers...)

Arroseurs et système pivot :
Céréales, haricots verts, riz...

Arroseurs et système pivot :
Cultures fourragères, luzerne, etc...

Dosage par hectare et application

Sol sableux : 100 - 200 g/1.000 m²
Sol argileux : 75 - 150 g/1.000 m²
Applications pendant la phase de croissance :
Tous les 15 jours.

Sol sableux : 200 - 400 g/Ha
Sol argileux : 150 - 300 g/Ha
Pendant la période de croissance :
Tous les 15 jours.

Sols sableux : 800 - 1.200 g/Ha
Sols argileux : 500 - 800 g/Ha
Pendant la période de croissance : 2 à 4 applications.

Sol sableux : 1.500 - 2.000 g/Ha
Sol argileux : 1.000 - 1.500 g/Ha
Pendant la croissance :
Après chaque tonte.

Application au sol

Jardins : Pelouses (Systèmes d'arrosage)

Jardins : Arbres, arbustes (irrigation goutte à goutte)

APPLICATION FOLIAIRE
Pour toutes les cultures
APPLICATION RACINE
TRAITEMENT DES SEMENCES

CHÉLATE DE FER
Amplificateur

Dosage par hectare et application

Sol sableux : 20 - 40 g/100 m²
Sol argileux : 15 - 30 g/100 m²
Pendant la croissance : Après chaque tonte.

Sol sableux : 100 - 200 g/Ha
Sol argileux : 75 - 150 g/Ha
Pendant la période de croissance : Toutes les 4 semaines.

150 - 300 g/Ha

30 g/20 L d'eau/Avant le repiquage

200 g/100 Kg de petites graines/Avant le semis
125 g/100 Kg grosses graines/Avant le semis

5-8 g/50 g Chélate 6%

