



Engrais azoté et
phosphoré
Foliaire / Sol

Phosphate monoammonique liquide

N-PHOSPHATE 12-61-00

COMPOSITION

%p/v

Nitrogen Total (N)	12,0
Ammoniacal nitrogen (N-NH ₄)	12,0
Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅)	61,0
pH 1-2	
Density 1,4	

- SOLUTION HAUTE CONCENTRATION
- FACILE À MANIPULER ET À APPLIQUER
- LIBREMENT SOLUBLE ET RAPIDEMENT DISSOLVANT
- PRODUIT DE HAUTE PURETÉ, SANS RÉSIDUS NI CONTAMINANTS

CARACTÉRISTIQUES

N-PHOSPHATE, phosphate monoammonique, est idéal pour une utilisation dans la phase de croissance initiale de toutes les cultures, immédiatement avant et après le semis et la plantation/repiquage.

Le **N-PHOSPHATE**, est une solution stable compatible avec tous les engrais directs à base de Phosphates. Il est particulièrement adapté pendant la première moitié du cycle de culture.

Le **N-PHOSPHATE**, est un engrais liquide sans chlorure ni sodium. C'est l'engrais idéal pour augmenter la disponibilité du phosphore du sol, en particulier dans les sols calcaires. Le N-PHOSPHATE consiste en une grande pureté de nutriments et sans résidus ni contaminants.

ACTIONS

- ✓ AMÉLIORE LA CROISSANCE DE RACINES ET DE POUSSES DE HAUTE QUALITÉ.
- ✓ ALIMENTER LA PERFORMANCE GLOBALE DE LA PLANTE.
- ✓ MEILLEURE ENU (EFFICACITÉ DE L'UTILISATION DES NUTRIMENTS) DANS LES SOLS ALCALINS ET ACIDES.
- ✓ PROCURE UN EFFET ACIDIFIANT SUR LA SOLUTION DU SOL FAVORISANT LA SOLUBILITÉ DU PHOSPHORE ET DES MICRONUTRIMENTS

APPLICATION FOLIAIRE

Culture

Céréales

Période : Printemps

Taux : 5-6 L/Ha

Commentaires : Appliquer lorsqu'une carence est soupçonnée, lorsque les conditions du sol ou les conditions météorologiques empêchent une absorption adéquate du phosphate par les racines, ou lorsque l'analyse SAP montre un faible état nutritionnel.

Maïs

Période : 4-8 feuilles

Taux : 5-6 L/Ha

Commentaires : Appliquer lorsqu'une carence est soupçonnée, lorsque les conditions du sol ou les conditions météorologiques empêchent une absorption adéquate du phosphate par les racines, ou lorsque l'analyse SAP montre un faible état nutritionnel. Répétez si nécessaire à intervalles de 10 à 14 jours.

Pomme de terre

Période : 7 à 10 jours après l'initiation du tubercule

Dose : 15 L/Ha

Commentaires : À 7-10 jours du début de l'initiation des tubercules. À ce stade, les cultures se

Autres cultures

Calendrier : Au besoin

Taux : 5-6 L/Ha

Commentaires : Appliquer lorsqu'une carence est suspectée, répéter après 10 à 14 jours si nécessaire.

Ne pas appliquer de pesticides en mélange en réservoir lorsque les cultures présentent des symptômes de carence, sont soumises à un stress ou sont soumises à des conditions météorologiques défavorables.

SOURCE DE PHOSPHORE TRÈS EFFICACE SOUS FORME DE PHOSPHATE (H₂PO₄) QUI FAVORISE UNE ABSORPTION RAPIDE PAR LA PLANTE

