

Datasheet

Engrais
potassique
Foliaire / Sol

Rendement et qualité

Engrais potassique
aux extraits humiques

RENK

COMPOSITION

%p/v

Potassium (K ₂ O)	43,0
Extrait humique total	9,0
Acides humiques	7,0
Acides Fulviques	2,0
Densité : 1,5 g/cc	
Sans chlorure	

- Forte concentration de K avec acides aminés.
- Transport systémique du potassium dans la plante.
- Absorption et translocation plus rapides du potassium.
- Utilisations pour prévenir ou corriger les carences en potassium dans toutes les cultures.

ACTIONS

- ✓ ACCÉLÈRE LA FRUCTIFICATION.
- ✓ MATURATION HOMOGENE.
- ✓ AUGMENTE LA VALEUR NUTRITIVE, LA TENEUR EN SUCRES ET EN HUILES DES FRUITS.
- ✓ AMPLIFIE LE RENDEMENT ET LA QUALITÉ DES RÉCOLTES.
- ✓ STIMULE LA MATURATION, LE CALIBRAGE ET LA QUALITÉ DES FRUITS.

CARACTÉRISTIQUES

Dans **RENK**, les acides organiques de faible poids moléculaire pénètrent très efficacement les membranes cellulaires. Ils transportent des ions positifs, comme le potassium, dans la cellule, ce qui entraîne une concentration plus élevée de potassium.

RENK est une formulation optimale de potassium pour assurer un apport adéquat de ce macronutriment important. Renk maintient un niveau optimal de potassium en période de forte demande de la plante.

Le potassium complexé aux acides humiques de **RENK** améliore la fertilisation potassique tout en augmentant l'absorption d'autres nutriments essentiels.

APPLICATION FOLIAIRE

FERTIRRIGATION 15-40 l/ha
FOLIAIRE 300-600 cc/100l

Agrumes	Lors de la nouaison, du grossissement des fruits et avant la récolte.
Coton	2 à 4 applications tout au long du cycle de culture.
Fruit	Lors de la nouaison, du grossissement des fruits et avant la récolte.
Horticultural	2 à 6 applications tout au long du cycle de culture.
Olive	Lors de la nouaison, du grossissement des fruits et avant la récolte.
Ornamental	2 à 4 applications tout au long du cycle de culture.
Fraises	1 à 3 applications sur la floraison et la fructification des tubercules.
Betterave à sucre	Début 2 mois avant la récolte.
Fruits tropicaux	2 à 4 applications pendant le cycle de culture.
Vigne	En période de grossissement, de maturation et de coloration des fruits.

RENK, est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires couramment utilisés en agriculture. Cependant, il est recommandé d'effectuer un essai préalable avant le mélange. Pour améliorer la qualité des fruits (sucre, couleur, fermeté, etc.), appliquer dès le début du développement des fruits, à 10-20 jours d'intervalle.

L'application est recommandée pendant les phases de grossissement et de maturation des fruits, ainsi que pour induire une altération de la couleur.

