



Engrais Foliaire/Sol



X-PK

COMPOSITION

%p/v

Phosphore (P₂O₅)

45,0

Potassium K₂O

50,0

Spécial pour les cultures extensives.
Engrais au phosphore et au potassium.

CARACTÉRISTIQUES

X-PK est un engrais liquide à forte concentration en phosphore (P) et en potassium (K), conçu pour les cultures extensives. Sa formulation est particulièrement adaptée à une application ponctuelle pour assurer un apport adéquat en phosphore et en potassium à certains stades de croissance.

ACTIONS

ENGRAIS RICHE EN PHOSPHORE ET EN POTASSIUM.
HAUTE SOLUBILITÉ DES MACRONUTRIMENTS (P, K)
**TECHNOLOGIE MAXIMALE AVEC DES MATIÈRES PREMIÈRES
HAUTEMENT SÉLECTIONNÉES.**
100 % SANS IMPURETÉS NI CHLORE.
SÉCURITÉ, CONFORT ET MANIPULATION FACILE.

APPLICATION

CULTURES	OBJECTIF/PROBLÈME	RECOMMANDATIONS	TEMPS
Dans toutes les cultures	Pour fournir du phosphore et du potassium.	3-5L/ha (dans min. 200L d'eau ou 0,5-1% ; pour les cultures sensibles et sous verre/film 0,25-0,5%).	Lorsque requis.
Céréales	Bilan énergétique, rendement, efficacité N, vitalité.	2 fois 4L/ha (particulièrement en cas de froid et d'humidité).	Au printemps dès le début de la végétation.
Céréales	Bilan énergétique, efficacité N, vitalité, rusticité hivernale.	4L/ha (particulièrement par temps froid et humide).	En automne dès le stade 3 feuilles.
Légumineuses (soja inclus)	Nodulation, qualité, maturation.	2 fois 4L/ha.	À partir du stade 6 feuilles.
Maïs	Développement initial, bilan énergétique, efficacité N, vitalité.	4L/ha (particulièrement par temps froid et humide).	À partir du stade 4 feuilles.
Colza	Bilan énergétique, efficacité N, vitalité.	1 à 2 fois 4 L/ha (particulièrement en cas de froid et d'humidité).	Au printemps, du début de la végétation jusqu'au début de la floraison.
Tournesol	Développement initial, bilan énergétique, efficacité N, vitalité.	4L/ha (particulièrement par temps froid et humide).	À partir du stade 4 feuilles.
Betterave à sucre	Structure des feuilles, développement juvénile, efficacité de l'azote, croissance des racines, formation de sucre.	2 fois 4L/ha.	À partir du stade 6 feuilles.
Pomme de terre	Rendement, qualité du tubercule et de la peau, croissance du tubercule.	2 fois 4L/ha.	Issu d'un tubercule de 10mm de diamètre.
Fraises	Développement initial, équilibre énergétique et hydrique vital, efficacité N.	2 fois 4-6L/ha.	Début de la végétation.
Fraises	Fermeté du fruit, taille du fruit.	1-3 fois 4-6L/ha.	De la nouaison à la récolte
Pomme	Promotion de la couleur rouge du dessus, de la taille des fruits, de la fermeté des fruits.	2-4 fois 4-6L/ha.	Entre la chute des fruits en juin et la récolte.
Fruit à noyau	Promotion de la fermeté des fruits, de leur taille, de leur teneur en sucre.	2 fois 4-6L/ha.	De la nouaison à la récolte.
Fruits tendres	Fermeté du fruit, taille du fruit.	1-3 fois 4-6L/ha.	De la nouaison à la récolte.
Fruits tendres	Développement initial, validité, bilan énergétique et hydrique, efficacité N.	2 fois 4-6L/ha.	Début de la végétation.
Raisins du désert	Développement initial, validité, bilan énergétique et hydrique, efficacité N.	2 fois 4-6L/ha.	Du stade 5 feuilles au début de la floraison
Raisins de cuve	Développement initial, validité, bilan énergétique et hydrique, efficacité N.	2 fois 4-6L/ha.	Du stade 5 feuilles au début de la floraison.
Légumes généraux	Développement initial, validité, bilan énergétique et hydrique, efficacité N.	1 à 2 fois 4 à 8 L/ha (particulièrement en cas de froid et d'humidité).	Une fois qu'une masse foliaire suffisante s'est développée.
Asperge	Bilan énergétique, rendement, efficacité N, dépôt de substances de réserve, validité.	1 à 3 fois 4 à 6 L/ha	À partir du milieu de la période de végétation.

