

Datasheet

Correcteur
de bore
Foliaire

Correcteur de bore

CARACTÉRISTIQUES

Le bore est un micronutriment essentiel à la nutrition des plantes. L'application de BORON UP au sol, les pulvérisations foliaires ou la pulvérisation de BORON UP peuvent assurer un apport suffisant en bore pour une croissance optimale. BORON UP est un engrais mono-nutriment de haute pureté contenant 20,50 % de bore (B). Grâce à son processus de dissolution rapide, il peut être appliqué en fertirrigation et en hydroponie, et est particulièrement recommandé en

BORON UP

COMPOSITION

%p/p

Bore (B)

20,50

- ✓ FLORAISON ET FRUCTIFICATION
- ✓ DÉVELOPPEMENT DE SEMENCES VIABLES
- ✓ TRANSPORT DU SUCRE
- ✓ QUALITÉ DE RENDEMENT AMÉLIORÉE
- ✓ RENDEMENT AUGMENTÉ

application foliaire. Une application appropriée de BORON UP peut atténuer les carences en bore dans les cultures, notamment les céréales, le colza, la betterave sucrière, la pomme de terre, les légumes du genre Brassica, les légumineuses et les fruits à pépins/à noyau. Ce traitement prévient et corrige efficacement les troubles physiologiques graves qui, autrement, entraîneraient des pertes substantielles de rendement, tant en quantité qu'en qualité.

APPLICATION

Cultures	N° d' Appl.	Stade phénologique de la culture	Taux d'appl (kg/ha)	Solution de pulvérisation application (L/ha)	
		CULTURES ARABLES			
légumineuses	2	Développement des graines en bout de gousse	1	200-300	
	2	4 à 6 feuilles 6 à 8 feuilles	0,5 0,5-1		
Pomme de terre	3	Fermeture inter-rangs Formation de tubercules Développement des fruits	1 1 1		
	1	Développement des pousses latérales et de la pousse principale	1		
	Betterave à sucre	2	4 à 6 feuilles Fermeture inter-rangs		2 2
1		Premier nœud à la feuille drapeau	1		
		CULTURES DE VERGERS			
Arbres à pépins : pommier/poirier	4	Débourrement Bourgeon blanc Floraison Après la récolte des fruits	1-2 1-2 1-2 1-2	500-800	
		CULTURES MARAÎCHÈRES			
	Plantes du genre Brassica : chou, chou-fleur, brocoli	2-3	Développement des feuilles Croissance des rosettes Développement de parties végétatives de plantes récoltables		0,5 1 0,5-1
		Légumes bulbes oignon, poireau	2-3		Développement des feuilles Développement de parties végétatives de plantes récoltables
Cucurbitacées : citrouille, courgette, concombre			3	Développement des feuilles Formation des pousses latérales, émergence des inflorescences. Floraison. Développement des fruits.	0,5 1 0,5
	Légumes-feuilles	1	Développement de parties végétatives de plantes récoltables.	0,5	
	légumineuses	3	Développement des feuilles. Développement des pousses latérales et de la pousse principale. Émergence des inflorescences et floraison.	0,5-1 1 1	300-500
Légumes racines : carotte, céleri, betterave		2-5	Développement des feuilles Stade BBCH : 14-16 Développement des feuilles Stade BBCH : 17-19 Développement de parties végétatives de plantes récoltables Développement de parties végétatives de plantes récoltables Développement de parties végétatives de plantes récoltables	0,5 0,5 1 0,5-1 0,5-1	
		Solanacées : tomate, poivron, pomme de terre primeur	2-5	Développement des feuilles, formation et croissance des pousses latérales, tuberculisation. Émergence des inflorescences et floraison. Développement des fruits. Maturation des fruits et des graines.	

