

NEW

## Datasheet

tangel<sup>AGRO</sup>

Correcteur  
nutritionnel  
Sol / Foliaire



Engrais solide correcteur de carences multiples

## CARACTÉRISTIQUES

**TANGEL MIX MICRO** est un composé SOLIDE, hautement soluble dans tous les types d'eau, dont les micronutriments fer, manganèse, cuivre, zinc, bore, molybdène et magnésium contribuent simultanément à la plante en lui apportant la dose nécessaire de nutriments indispensables au développement optimal de toute culture.

Outre le bore et le molybdène, les nutriments contenus dans **TANGEL MIX MICRO** sont contenus dans une molécule (EDTA, acide éthylènediaminétriacétique) qui les protège dans le sol et, une fois appliqués sur les feuilles, facilitent leur absorption et leur transport vers la plante.

## APPLICATIONS

| CULTURES                                                                 | Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Céréales, légumineuses à grains, oléagineux, coton, maïs, cultures d'été | <b>DOSE :</b> 1 à 1,5 kg/ha <b>APPLICATION :</b> Foliaire<br><b>COMMENTAIRES IMPORTANTS :</b> Appliquer en début de saison, au tallage et à la montaison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pâturages, luzerne et cultures fourragères.                              | <b>DOSE :</b> 1-2 kg/ha <b>APPLICATION :</b> Foliaire <b>COMMENTAIRES CRITIQUES :</b> Appliquer après chaque pâturage ou coupe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pommes de terre et autres tubercules.                                    | <b>DOSE :</b> 1 kg/ha. <b>APPLICATION :</b> Foliaire.<br><b>REMARQUES :</b> Effectuer jusqu'à 4 applications à partir du stade 10 cm jusqu'à la postfloraison, à 7 à 10 jours d'intervalle. Appliquer dans un minimum de 500 L/ha d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Légumes                                                                  | <b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Effectuer jusqu'à 3 applications à 10-15 jours d'intervalle lorsque le feuillage est suffisant. Appliquer dans un minimum de 500 L/ha d'eau. <b>DOSE :</b> 5-10 kg/ha <b>APPLICATION :</b> Sol <b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer avant le semis, le repiquage ou le début de la croissance des plantes. <b>DOSE :</b> 2-3 kg/ha <b>APPLICATION :</b> Fertilisation <b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer tous les 7-10 jours pendant le cycle de culture. <b>DOSE :</b> 2-3 kg/1 000 L <b>APPLICATION :</b> Hydroponie <b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer au besoin : 1 L de solution préparée pour 100 L d'eau d'irrigation. Utiliser la dose la plus élevée pendant le développement des cultures, les périodes de températures élevées ou les journées plus courtes et plus fraîches. |
| Vignes (vinicoles et de table).                                          | <b>APPLICATION :</b> Application foliaire<br><b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer 2 à 3 fois pendant le cycle de culture. Appliquer uniquement en dilution. Ne pas dépasser la dose maximale par hectare. Dosage minimal : 500 L d'eau par ha.<br><b>DOSE :</b> 2 à 3 kg/ha. <b>APPLICATION :</b> Fertilisation <b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer tous les 7 à 10 jours pendant le cycle de culture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## TANGEL MIX MICRO

## COMPOSITION

%p/p

|                      |      |
|----------------------|------|
| Fer (Fe)             | 7,50 |
| Manganèse (Mn)       | 3,50 |
| Zinc (Zn)            | 0,70 |
| Bore (B)             | 0,65 |
| Molybdène (Mo)       | 0,30 |
| Cuivre (Cu)          | 0,28 |
| Agent chélateur EDTA |      |

- SOLUBILITÉ TOTALE
- ASSIMILATION RAPIDE ET EFFICACE
- POUR TOUS TYPES DE CULTURES

## ACTIONS

- ✓ CORRIGE LES GRAVES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS.
- ✓ AMÉLIORE LE RENDEMENT ET LA QUALITÉ DES CULTURES.
- ✓ L'EDTA (AGENT CHÉLATANT) FACILITE L'ABSORPTION ET LE TRANSPORT VERS LA PLANTE.

| CULTURES                                                                           | Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pommes, poires, fruits à coque, agrumes, mangues, fruits à noyau, avocats, ananas. | <b>APPLICATION :</b> Application foliaire<br><b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer 2 à 3 fois pendant le cycle de culture. Appliquer uniquement par dilution. Ne pas dépasser la dose maximale par hectare. Dosage minimal : 500 L d'eau par ha.<br><b>DOSE :</b> 2 à 3 kg/ha. <b>APPLICATION :</b> Fertilisation <b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer tous les 7 à 10 jours pendant le cycle de culture. |
| Olives.                                                                            | <b>DOSE :</b> 0,5-1,5 kg/ha <b>APPLICATION :</b> Foliaire<br><b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer lorsque le feuillage est suffisant. Appliquer dans un minimum de 500 L/ha d'eau.<br><b>DOSE :</b> 5-10 kg/ha <b>APPLICATION :</b> Sol<br><b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer avant le semis, le repiquage ou le début de la croissance des plants.                                                    |
| Fraises                                                                            | <b>DOSE :</b> 2 à 3 kg/ha <b>APPLICATION :</b> Fertilisation<br><b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer tous les 7 à 10 jours pendant le cycle de culture.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Autres cultures de petits fruits                                                   | <b>DOSE :</b> 2-3 kg/1 000 L <b>APPLICATION :</b> Hydroponie.<br><b>REMARQUES IMPORTANTES :</b> Appliquer selon les besoins : 1 L de solution préparée pour 100 L d'eau d'irrigation. Utiliser la dose la plus élevée pendant le développement des cultures, les périodes de fortes chaleurs ou les journées plus courtes et plus fraîches.                                                                      |

MICRONUTRIMENTS  
tangel<sup>AGRO</sup>

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :  
1Kg - 5Kg - 20Kg - 500Kg  
Sac / Grand Sac

ENGRAIS  
CE  
IMPORTÉ  
DE L'UE

