

Datasheet

ZINC FORTE



Correcteur
nutritionnel
Sol / Foliaire

Correcteur Complexe Organique de Zn

CARACTÉRISTIQUES

ZINC FORTE est un composé de zinc sous forme de complexe organique. Il est recommandé pour les cultures exigeantes en zinc, comme le maïs, les pommes de terre, les céréales, les arbres fruitiers, les fraises, les oignons, les épinards et le soja. **ZINC FORTE** est recommandé pour les sols à pH élevé, à forte teneur en phosphore et présentant un manque d'oxygène au niveau des racines. Le zinc est un élément essentiel à la nutrition des plantes. Il est nécessaire au métabolisme des protéines et fait partie du système enzymatique qui régule la croissance des plantes. Le zinc figure en bonne place parmi les nutriments végétaux, car il est l'un des facteurs les plus limitants de la production végétale.

APPLICATION

CULTURES	FERTIGATION	SPRAY FOLIAIRE
POMME	400 – 800 gr / 1000L m ² par application	100 – 150 gr / 100L
CÉRÉALES	200 – 300 gr / 1000 m ²	80 – 120 gr / 100L
AGRUMES	400 – 800 GR / 1000L m ² par application	100 – 150 gr / 100L
MAÏS	200 – 300 gr / 1000 m ²	80 – 120 gr / 100L
CONCOMBRE	300 – 1500 gr / 1000 m ² par application	100 – 120 gr / 100L
LAITUE	300 – 1500 gr / 1000 m ² par application	100 – 120 gr / 100L
MELON	300 – 1500 gr / 1000 m ² par application	100 – 120 gr / 100L

CULTURE	FERTIGATION	SPRAY FOLIAIRE
OLIVIER	300 – 400 gr / 1000 m ² par application	100 – 120 gr / 100L
POIRE	400 – 800 gr / 1000L m ² par application	100 – 150 gr / 100L
POIVRE	300 – 1500 gr / 1000 m ² par application	100 – 120 gr / 100L
POMME DE TERRE	200 – 300 gr / 1000 m ²	80 – 120 gr / 100L
TOMATE	300 – 1500 gr / 1000 m ² par application	100 – 120 gr / 100L
VIGNE	300 – 400 gr / 1000 m ² par application	100 – 120 gr / 100L

TOUS TYPES DE CULTURES :
2,0 – 2,5 Kg / ha

COMPOSITION

%p/p


Zinc (Zn)
pH (1%) 6,5 ± 0,5

30,00

- MEILLEUR DÉVELOPPEMENT DES RACINES.
- CROISSANCE PLUS VIGOUREUSE DES POUSSES
- MEILLEURE FORMATION DES FLEURS ET NOUAISSON DES FRUITS.
- UNE MATURITÉ PLUS UNIFORME
- UTILISATION PLUS EFFICACE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS DU SOL ET DES ENGRAIS.

ACTIONS

CAUSES DE LA CARENCE EN ZINC DANS LES CULTURES



Maintenir la solution dans le réservoir sous agitation pendant 10 à 15 minutes. Des applications préventives sont recommandées. En cas de carence, appliquer **ZINC FORTE** dès que possible, à tout moment.

! secouez-le avant utilisation

