



Autodéfense au
phosphite
Sol/Foliaire



PHIT-PK

COMPOSITION

	%p/p
Phosphonate de potassium	95,0
Phosphore (P ₂ O ₅)	57,0
Potassium (K ₂ O)	38,0

- ACTION NUTRITIONNELLE P ET K
- LUTTE CONTRE LES MALADIES
- RENDEMENT ET QUALITÉ

ACTIVITÉ SYSTÉMIQUE POUR UN CONTRÔLE EFFICACE DES MALADIES.

INDUCTEUR DE LA DÉFENSE NATURELLE DES PLANTES.

PHOSPHONATE DE POTASSIUM CRISTALLIN.

Engrais P et K.
Action fongicide

CARACTÉRISTIQUES

PHIT-PK est un produit hydrosoluble et stabilisé pour applications foliaires, arrosage du sol, irrigation goutte à goutte, peinture sur tronc et hydroponie. Il stimule la production de phytoalexines, qui renforcent les défenses naturelles de l'hôte contre les champignons Oomycètes. Poudre soluble et **PHIT-PK** est facilement absorbé par les feuilles, les racines et l'écorce des arbres. Grâce à son action systémique ascendante et descendante, il agit rapidement sur les tissus sensibles, augmentant ainsi la résistance de l'hôte aux attaques fongiques.

APPLICATION

Application/doses	Volume de pulvérisation	Remarques
AGRUMES AVOCAT FRUITS SUPÉRIEURS		
Pulvérisation foliaire (H.V.) 250 g/hl	1.000-3.000 l/ha	Trois (3) traitements préventifs par saison sont recommandés : au début du printemps, en été et au début de l'automne. Sur les fruits à tiges, traiter une ou deux fois avant la floraison et/ou la chute des pétales, afin de prévenir le feu bactérien.
Pulvérisation foliaire (atomiseur) 600 g/hl	300 - 1.200 l/ha	
Peinture pour coffre 300 g/l	—	Gratter la partie infectée de la tige et peindre la zone affectée. Cas graves : effectuer trois (3) traitements par saison.
Sol (par irrigation goutte à goutte) 5 à 7 kg/ha	—	Faire 2 traitements préventifs : 1er au printemps : 2ème en automne.
FRAISES		
Sol (par irrigation goutte à goutte) 2,5 à 5 kg/ha	—	Effectuer 2 à 3 traitements de l'enracinement à la floraison pour prévenir les attaques de Phytophthora cactorum.
Pulvérisation foliaire 250 g/hl	800 - 1.000 l/ha	Du début de la floraison à la fin de la récolte, faire 3 à 4 traitements.
VIGNOBLE ET RAISINS DE TABLE		
Viney. Spray foliaire (brumisateur) 500 g/hl	300 - 500 l/ha	Traiter tous les 15 jours, de la floraison à la maturité. Un mélange en cuve avec des fongicides préventifs comme le Folpet ou le Mancozed est recommandé.
Tab. Pulvérisation foliaire pour raisins 250 g/hl	600 - 1.000 l/ha	

ACTIONS

- ✓ TENEUR ACCRUE EN PHYTOALEXINE ET EN CHITINASE.
- ✓ RENFORCEMENT AMÉLIORÉ DE LA PAROI CELLULAIRE ET ACTIVATION DES DÉFENSES NATURELLES.
- ✓ TENEUR EN PHOSPHORE, BIOMASSE ET SURFACE FOLIAIRE ACCRUES.
- ✓ TENEUR ACCRUE EN SUCRES SOLUBLES ET FERMETÉ DES FRUITS.
- ✓ AUGMENTATION DE LA TAILLE ET DU RENDEMENT DES FRUITS.

Application/doses	Volume de pulvérisation	Remarques
LAITIUE ET CULTURES À FEUILLES		
Pulvérisation foliaire 2,5 kg/ha	600 - 1.000 l/ha	Deux (2) traitements sont recommandés : 1er : 7 à 10 jours après le repiquage / 2ème : 15 jours plus tard.
OIGNONS		
Pulvérisation foliaire 1,5 - 2,5 kg/ha	300 - 500 l/ha	Trois (3) : traitements préventifs par saison : 1er : stade trois (3) vraies feuilles/2e : 15 jours plus tard/3e : 15-21 jours plus tard.
CLÔTURES DE CONIFÈRES		
Pulvérisation foliaire 250 g/hl	600 - 1.000 l/ha	Effectuer 4 traitements par mois du printemps au milieu de l'été. Utiliser jusqu'à 20-30 g pour les grands arbres isolés (arrosage du sol).
Sol (irrigation goutte à goutte ou trempage) 10 g/m² de clôture	—	
TOMATES/CUCURBITES		
Pulvérisation foliaire 150-250 g/hl	800 - 1.000 l/ha	Bimensuel (15 jours) de la floraison jusqu'à mi-fin de la récolte.
POIVRONS		
Sol (irrigation goutte à goutte ou par arrosage) 2,5 kg/ha	—	Tous les 15 à 21 jours à partir d'une semaine après le repiquage jusqu'à la récolte.
TERRAINS DE GAZON ET DE GOLF		
Irrigation foliaire ou par aspersion 0,75-1 kg/1.000 m²	—	Traitements mensuels du début du printemps à la mi-automne.

AUTODÉFENSE AU PHOSPHITE

pangel_{AGRO}
www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
1Kg - 2Kg - 5Kg - 20Kg
Sac



IMPORTÉ
DE L'UE

