

Datasheet

Enracinement
Foliaire / Sol

+ROOT

COMPOSITION

%p/v

Acides aminés	4,00
Total azote (N)	2,48
Phosphore (P ₂ O ₅)	12,00
Potassium (K ₂ O)	6,30
Matière organique	33,75
Acides fulviques	19,50
Carbone organique	17,73
IBA	0,2

• PROPORTION ÉQUILIBRÉE DE MATIÈRE ORGANIQUE ET DE NUTRIMENTS

• CONTIENT DES PHYTOHORMONES NATURELLES SPÉCIFIQUES À L'ENRACINEMENT

ACTIONS

- ✓ DENSITÉ RACINAIRE PLUS ÉLEVÉE.
- ✓ ABSORPTION AUGMENTÉE D'EAU ET DE NUTRIMENTS. RÉSISTANCE ACCRUE AUX FACTEURS DE STRESS.
- ✓ RÉTABLISSEMENT DES RACINES ENDOMMAGÉES PAR L'ACTIVITÉ DES NÉMATODES ET DES CHAMPIGNONS.
- ✓ AUGMENTATION DE LA SYNTHÈSE DE CYTOKININES ENDOGÈNES DANS LES RACINES.

Développement des racines

CARACTÉRISTIQUES

+ ROOT est un produit à appliquer dès les premiers stades de développement des plantes afin d'améliorer leur enracinement.

La synergie entre tous les composants de + ROOT permet d'améliorer la capacité d'assimilation et la mobilité des macronutriments et des micronutriments à l'intérieur de la plante, accélérant ainsi le développement du système racinaire et un démarrage optimal des cultures.

La matière organique de + ROOT apporte une source d'énergie aux processus biologiques et stimule la vie microbienne du sol (rhizosphère).

Ce produit a un effet biostimulant sur les plantes, activant la production d'auxines, ce qui favorise la division cellulaire et induit la formation de racines latérales et d'adventices.

Sa composition aide les plantes à atteindre leur potentiel génétique maximal et à développer un système racinaire solide, ce qui augmente l'absorption des nutriments et de l'eau.

APPLICATION AU SOL

Cultures	Dosage	Applications/Traitements
Lits de semence	5-15 ml/L	1 - 3 / Former des cotylédons
Horticulture d'extérieur (Transplantation)	10-20 L/Ha	1 - 2 / Au premier arrosage de la plante et 8-15 jours
arbres de serre horticole	2-3 L/Ha	1 - 2 / Lors du premier arrosage et 8-15 jours
Plantes à massif	10 ml/base	1 - 2 / Au début de l'activateur
Jeunes arbres	20-50 ml/base	lorsque nécessaire pour
Arbres adultes	40-60 ml/base	recupérer la masse racinaire

Pour une application foliaire sur ces cultures :
Doses générales : 300-500 cc/hl

APPLICATION FOLIAIRE

Cultures extensives	Applications/Traitements
Maïs	1 / Après le début de la végétation - Développement des feuilles (BBCH 10-14)
Colza	1 / Après le début de la végétation - Développement des feuilles (BBCH 10-14) 2 / Régénération du système racinaire après le début de la végétation printanière (BBCH 19/20)
Pomme de terre	1 / développement des feuilles (BBCH 10-14)
Betterave à sucre	1 / Après le début de la végétation - Développement des feuilles - Stade juvénile (BBCH 10-16) 2 / Développement des feuilles - Croissance de la rosette - Couverture végétale (BBCH 18-33)
Blé	1 / Après le début de la végétation - Développement des feuilles - 3 feuilles déployées (BBCH 10-13) 2 / Régénération du système racinaire après le début de la végétation printanière (BBCH 21/22)

Doses pour ces cultures extensives : 1-1,5 l/ha

AMÉLIORE LA FORMATION
DU SYSTÈME RACINAIRE



EXTRAIT D'ALGUES
Ascophyllum Nodosum

ACIDES AMINÉS

ENRACINEMENT
BIO-INDUCTEURS :

Acide alginique
Manitol

MICRONUTRIMENTS

ENRACINEMENT
tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
1L - 5L - 10L - 20L - 1000L
Bouteille en plastique/IBC



IMPORTÉ
DE L'UE

