

Datasheet



Enracinement
Foliaire / Sol



+ROOT SOLID

COMPOSITION

%p/p

Azote (N) total	7,00
Phosphore (P ₂ O ₅)	35,0
Acides aminés libres	20,0
Acide indolbutylique (IBA)	1500 ppm
Acide naphtyacétique (ANA)	500 ppm

Développement des racines

CARACTÉRISTIQUES

+ROOT SOLID présente une concentration élevée en phosphore (assimilation rapide) et des extraits organiques spécifiques favorisant l'enracinement à tous les stades de développement des cultures.

+ROOT SOLID est un biostimulant végétal qui favorise le développement et la croissance racinaire. En application foliaire et au sol, directement au niveau des racines, son action contribue à augmenter le flux de nutriments du sol vers la plante, lui conférant ainsi une plus grande résistance aux agressions environnementales.

+ROOT SOLID apporte les conditions et les éléments nécessaires au développement racinaire, favorisant ainsi sa croissance et augmentant la vigueur et la résistance des cultures.

Chaque molécule de **+ROOT SOLID** joue un rôle spécifique dans la stimulation du développement du système racinaire. De plus, la composition de Stym Root Solid présente un équilibre spécialement étudié pour favoriser le développement de la culture dès les premiers stades.

Recommandé pour :

+ROOT SOLID est utilisé dès le début de la croissance des plantes pour stimuler la croissance racinaire et favoriser leur activité dès les premiers stades. En cas de stress, il stimule également la plante. Son utilisation est recommandée pour tous types de cultures.

Le bon fonctionnement du système racinaire et la formation adéquate des tissus

vasculaires sont étroitement liés et constituent l'une des bases essentielles pour optimiser le potentiel productif des cultures.

De plus, c'est au niveau des racines que la plupart des hormones responsables de la régulation du métabolisme des plantes sont synthétisées lors de processus importants tels que la division cellulaire, l'épaississement et l'élongation, la sénescence, la nouaison et la croissance des fruits, etc.

ACTIONS

-  **INDUCTION DE LA FORMATION DE POILS ABSORBANTS.**
-  **RENFORCEMENT DES RACINES, GRÂCE À LA PARTICIPATION DE PHOSPHORE ET DE POTASSIUM DE HAUTE ASSIMILATION.**
-  **AUGMENTER SA CROISSANCE ET OBTENIR UNE AUGMENTATION DE LA VIGUEUR ET DE LA RÉSISTANCE DE LA CULTURE.**
-  **EN SITUATION DE STRESS PERMET LE RENFORCEMENT DE LA ZONE RACINAIRE NÉCESSAIRE À LA RÉCUPÉRATION ET À LA RÉACTIVATION DES CULTURES.**
-  **AUGMENTE LE NOMBRE DE CULTURES.**

APPLICATIONS

CULTURES	DOSAGE Kg/Ha	TEMPS D'APPLICATION
Substrat ou substrat pour plateaux	Dissoudre 125-250 g dans suffisamment d'eau pour humidifier 100 kg de substrat.	Utiliser le faible dosage à des températures inférieures à 20°C et le dosage élevé à des températures supérieures à 20°C
Lits et plateaux de crèche	100g pour 200L d'eau.	Appliquer une fois par semaine, à partir de la troisième semaine de développement des semis
APPLICATIONS SUR LE TERRAIN		
Transplanter	100g pour 100L d'eau.	Appliquer au moment de la transplantation ou une semaine après l'application 400g pour 100L d'eau, appliquer directement à la base de la plante.
Foliaires	0,5 à 1 kg/ha.	Appliquer dans les deuxième et troisième semaines après la transplantation.
Irrigation goutte à goutte	2kg/Ha.	Diluer le produit dans l'eau d'irrigation. Appliquer les 2e, 3e et 4e semaines après la transplantation.

+ROOT SOLID s'applique par aspersion, en solution diluée dans la quantité d'eau indiquée dans la recommandation.

Pour les semis fraîchement transplantés, il est conseillé d'appliquer **+ROOT SOLID** dès le début de l'activité racinaire (1 à 5 jours après le repiquage). Attention : le produit peut rester profondément ancré dans les racines. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de répéter le traitement une ou deux fois par semaine.

Pour les cultures annuelles en cours de développement, il est conseillé d'appliquer **+ROOT SOLID** à 10-15 jours d'intervalle, de préférence pendant la période de coupe. Pour les plantes vivaces, appliquez-le dès le début du développement racinaire ou pendant la fructification. Pour un résultat optimal, il est recommandé de répéter le traitement 2 ou 3 fois.

Il est recommandé de le mélanger avec des produits homologués pour les cultures autorisées. Cependant, après un test de compatibilité, il est conseillé d'éviter de le mélanger avec des produits à base de calcium non chélatés.

ENRACINEMENT
tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
1kg - 5kg - 10kg - 20kg - 500Kg



IMPORTÉ
DE L'UE

