

NEW

tangel^{AGRO}

Datasheet



Extrait
d'algues
Foliaire / Sol



MARE AMINO

COMPOSITION

%p/v

Extrait d'algues	30,0
Azote total (N)	6,0
Acides aminés libres	4,0
Acides alginiques	5,0
Manitol	1,5
Densité : 1,19 g/cc	

- 100 % EXTRAIT D'ALGUES ASCOPHYLLUM
- ACIDES AMINÉS DE L'HYDROLYSE ENZYMATIQUE. ORIGINE VÉGÉTALE
- ENRICHI EN MICRO- ET MACRONUTRIMENTS ET EN ACIDES HUMIQUES

Algues. Action biostimulante

CARACTÉRISTIQUES

MARE AMINO est un produit qui associe de façon équilibrée l'action des acides aminés L-α d'origine végétale et d'un extrait d'algue *Ascophyllum nodosum*, pour obtenir un biostimulant complet.

MARE AMINO contient un équilibre d'acides aminés L-α spécifiques, obtenus par hydrolyse enzymatique avec des polysaccharides (tels que l'acide alginique et le mannitol, entre autres), qui exercent une action synergique sur la stimulation des processus physiologiques précédemment cités.



FLORAISON



DÉBUTAGE DES FRUITS



MATURITÉ

ACTIONS

- ✓ FAVORISE LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES ET DES SUBSTANCES DE CROISSANCE NATURELLES
- ✓ STIMULE LA CROISSANCE RACINAIRE
- ✓ AMÉLIORATION DE L'ABSORPTION DES NUTRIMENTS PAR LES RACINES ET LES FEUILLES
- ✓ RÉSISTANCE AUX MALADIES ET AUX RAVAGEURS
- ✓ PRÉCURSEUR DES AUXINES, QUI STIMULENT LA CROISSANCE VÉGÉTATIVE DES PLANTES
- ✓ AMÉLIORE LA NOUAISSON, LA MATURATION ET LA COULEUR DES FRUITS, AUGMENTANT AINSI LEUR QUALITÉ ET LEUR QUANTITÉ

APPLICATION FOLIAIRE

Cultures	Doses et Application
Arbres fruitiers, agrumes, vignes, noyers, oliviers	2 à 3 L/ha par application 3 à 4 applications à 10-14 jours d'intervalle, du débourrement à la floraison et pendant le développement des fruits
Cultures horticoles : poivrons, cucurbitacées, fraises, tomates	2 à 3 L/ha par application. Appliquer 2 semaines après la transplantation pour une croissance rapide des plants et pendant la fructification.
Laitue et légumes à feuilles	1,5 à 2 L/ha par application. 2 à 3 applications à 7-10 jours d'intervalle, en commençant lorsque le feuillage est bien développé.
Pomme de terre	2 à 3 L/ha par application. Appliquer pendant la phase de croissance végétative.
Céréales	1 à 2 L/ha par application. 1 à 2 applications du début de la montaison jusqu'à la floraison.

Recommandation générale : 1 à 3 L/1 000 L ou 1 à 3 L/ha

APPLICATION AU SOL

Cultures	Doses Application
Fertirrigation Irrigation goutte à goutte	1 à 5 l/ha, répartis en plusieurs applications 2 à 3 l/ha par application. Appliquer toutes les deux semaines pour maintenir l'effet prolongé sur la culture

Cautions:

Évitez de mélanger MARE AMINO avec des produits à base de cuivre ou d'huile minérale. Les doses sont approximatives et peuvent varier selon les caractéristiques de la zone et les besoins des cultures.

SEAWEED EXTRACT

tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
1L - 5L - 10L - 20L / 1000L
Bouteille en plastique/IBC

