



Extrait d'algues Foliaire / Sol



MARE

COMPOSITION

	%p/v
Extrait d'algues	20,0
Azote (N)	4,0
Potassium (K ₂ O)	3,5
Acide alginique	3,0
Manitol	0,8
Densité : 1,09 g/cc	

Extrait d'algues. Bioactivateur

CARACTÉRISTIQUES

MARE est un produit à base d'extraits d'algues marines (*Ascophyllum nodosum*) obtenus grâce à une méthode d'extraction minutieuse qui préserve toutes les propriétés des molécules.

MARE contient des phytohormones naturelles, des vitamines et des glucides (mannitol, alginates, acides organiques et macronutriments). La proportion de ces composants dans l'extrait est parfaitement équilibrée. L'association de tous ses composants agit en synergie, procurant un puissant effet activateur sur le développement des plantes.

MARE est particulièrement recommandé pour prévenir les phases phénologiques critiques telles que la croissance, la floraison, la nouaison et la maturation des fruits, ainsi que les périodes de conditions environnementales défavorables. Absorption rapide par le système foliaire et/ou racinaire.

APPLICATIONS

CULTURES	TEMPS	APPLICATION
Pomme	Début de floraison Pleine floraison Fin de floraison Taille du fruit : 5-10 mm	2 l/ha 2 l/ha 3 l/ha 3 l/ha
Fruit à noyau	Début de la floraison Chute des pétales Après la chute des premiers fruits	3 l/ha 3 l/ha 4 l/ha
Fraises	Croissance au début du printemps Première floraison Première nouaison	3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha
Raisins de cuve	Stade 5-6 feuilles Avant la floraison Nouaison / Ecllosion précoce	3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha
Raisins de table	1ère floraison, 2ème nouaison, 3ème taille du fruit 5-10 mm, 4ème fermeture des baies	3 l/ha
Tomates, poivrons, melons aubergines, concombres, courges	4 traitements commençant à la (première) floraison à intervalles de 14 jours	2,5 l/ha ou 250 ml/hl
Brocoli, chou-fleur, chou	Stade 4 à 6 vraies feuilles 10 à 14 jours plus tard initiation de l'épiaison	3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha

• 100 % EXTRAIT D'ALGUES ASCOPHYLLUM

• PROPORTION ÉQUILBRÉE DE MACRO ET MICRONUTRIMENTS

ACTIONS

- AUGMENTE LA TOLÉRANCE AU STRESS HYDRIQUE, À LA SALINITÉ ET AUX BASSES TEMPÉRATURES.**
- STIMULE LA POUSSE DES POUSSES.**
- FAVORISE LA NOUAISON.**
- STIMULE LA CROISSANCE DES FRUITS.**
- AUGMENTE LA TOLÉRANCE AUX MALADIES ET AUX RAVAGEURS CAUSÉS PAR LE STRESS.**

CULTURES	TEMPS	APPLICATION
Asperge	14 jours après la fin des vendanges Environ 3 semaines plus tard.	5 l/ha 5 l/ha
Avocat	Avant la floraison (stade chou-fleur), pleine floraison et après la floraison.	3 l/ha
Enracinement/ Transplantation/ Solution	Égouttement des racines des plants avant la plantation.	0,01 %
Blé	Tallage précoce Feuille étandard entièrement élargie.	1 l/ha
Canola	Début de l'extension de la tige À la première inflorescence.	2-3 l/ha
Maïs	Stade 4-6 feuilles Stade 8-10 feuilles.	1 l/ha

Remarque : MARE peut être appliqué par pulvérisation et aspersion, en association avec des pesticides ainsi que des systèmes d'irrigation goutte à goutte/fertirrigation.

