



Extrait
d'algues
Foliaire / Sol

MARE KELP

COMPOSITION

%p/v

Extrait d'algues marines	30,0
Acide folique	0,10
Auxines	450ppm
Cytokines	1200ppm

Densité : 1,05
pH (solution à 10 %) : 4,4

• **EXTRAIT D'ALGUE 100 %
ECKLONIA MAXIMA**

• **FORTE CONCENTRATION
D'HORMONES NATURELLES**

Algues. Action biostimulante

CARACTÉRISTIQUES

MARE KELP est un biostimulant métabolique et promoteur racinaire naturel, obtenu par extraction naturelle de l'algue *Ecklonia maxima* KELP. **MARE KELP** contient un rapport auxine-cytokinine élevé, ainsi que des polysaccharides, de l'acide alginique, du mannitol et des micronutriments d'origine naturelle, stimulant fortement la formation de nouveaux points de croissance dans les racines des plantes traitées. Ces nouveaux poils racinaires provoquent naturellement une augmentation des cytokinines dans les plantes, synthétisées à l'apex des racines. Les cytokinines endogènes stimulent la croissance de la plante et la taille des fruits, tandis que l'apport d'auxines exogènes stimule le transport du calcium vers les fruits. Il améliore ainsi la fermeté et la durée de vie après récolte.

APPLICATIONS

CULTURE	DOSAGE/ APPLICATIONS	1ÈRE APPLICATION	2ÈME APPLICATION
Agrumes	300-500 cc/Ha	Au début de la germination	Engraissement des fruits
Maïs, soja, céréales	150-200 cc/Ha	Appliquer 20 à 25 jours après la levée.	
Pomme de terre	150-250 cc/Ha	6 à 10 feuilles de la plante, début de tubérisation	15 jours après la 1ère application.
Riz	250-300 cc/Ha	1ère application au moment du filleul, pour augmenter la production de grains.	
Fraises	300 cc/Ha	Floraison	Floraison/engraissement des fruits.
Fruits à noyau, Raisins de table	300-400 cc/Ha	Pré-floraison	Engraissement des fruits.
Betterave sucrière, coton et autres cultures industrielles	150-250 cc/Ha	1 application en pré-floraison ou par stades de 6 à 10 feuilles des plantes.	

ACTIONS

- ✓ **AUGMENTE LA MASSE RACINAIRE ET LA CROISSANCE DES SEMIS.**
- ✓ **AUGMENTE LE NOMBRE, LA TAILLE, LA COULEUR ET LA TENEUR EN SUCRE DES FRUITS.**
- ✓ **AMÉLIORE L'ABSORPTION DES NUTRIMENTS.**
- ✓ **ATTÉNUÉ LES EFFETS DU STRESS.**
- ✓ **AUGMENTE LA DURÉE DE CONSERVATION EN CAS DE STOCKAGE AU FROID.**



ENRACINEMENT



DÉBUTAGE DES FRUITS



RENDEMENT

Tournesol	300 cc/Ha	1 application pour 4 à 6 feuilles.	
Tabac	200 cc/Ha	1ère application à la transplantation.	2ème application foliaire 15 jours après la première application.
Tomate (Longue vie)	300 cc/Ha	Au début de la période de floraison.	Lorsque la nouaison atteint 20 à 30 %. Troisième application facultative après 2 à 3 semaines.
Tomate (Industrial)	400 cc/Ha	Lorsque 20 à 30 % des fleurs	
Poivron, concombre, aubergine, melon, pastèque	300-400cc/Ha	10 à 15 % de fleurs ouvertes	2 à 3 semaines après la première application
Fruits tropicaux (banane, ananas)	300-400cc/Ha	Floraison	Engraissement des fruits

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique de TANGEL AGRO.

