

NEW

tangel^{AGRO}

Datasheet

Extrait d'algues
Foliaire / Sol

MARE SOLID

COMPOSITION

%p/p

Extrait d'algues	25,0
Mannitol	1,0
Acide alginique	1,0
Extraits humiques totaux	40,0
Acides humiques	37,0
Acides fulviques	3,0
Acides aminés libres	25,0

- 100% SEAWEED EXTRACT ASCOPHYLLUM
- POWERING BY HUMIC AND FULVIC ACIDS

Algues. Action biostimulante

CARACTÉRISTIQUES

MARE SOLID est un stimulant de croissance à base de poudre microgranulaire, séchée par atomisation et fabriqué à partir d'*Ascophyllum nodosum*, qui améliore la coloration des cultures.

MARE SOLID contient des substances naturelles agissant comme promoteurs de croissance, augmentant le rendement et la vigueur des cultures, tout en améliorant leur couleur. **MARE SOLID** est indiqué dans les processus métaboliques et biochimiques qui renforcent la résistance de la plante aux différents stress biotiques et abiotiques. **MARE SOLID** intègre des phytohormones naturelles (auxines, cytokinines, bêtaïnes et gibbérellines), ainsi que des acides fulviques et humiques.

ACTIONS

- ✓ AMÉLIORE LA CROISSANCE DES RACINES ET LE DÉVELOPPEMENT DES PLANTES.
- ✓ AMÉLIORE LA SANTÉ NUTRITIONNELLE DES PLANTES.
- ✓ AUGMENTE LE RENDEMENT SOUHAITÉ.
- ✓ AUGMENTE LA VIGUEUR DES PLANTES.
- ✓ OPTIMISE LE POTENTIEL DE RÉCOLTE EN PÉRIODE DE STRESS.
- ✓ AUGMENTE LA GERMINATION DES GRAINES.

APPLICATIONS

Cultures	Doses Application
APPLICATION FOLIAIRE	
Agrumes	75 g/hL 1° préfloraison, 2° chute des pétales et 3° grossissement.
Arbres fruitiers	75 g/hL 3 applications, préfloraison (C) stade (E) stade (G) chute des pétales.
Vignoble et tonnelle	75 g/hL 1° sépare les inflorescences 2° les boutons floraux et 3° la nouaison des fruits.
Oliviers	75 g/hL 1° application au début de la période (printemps), 2° à 15 jours et 3° après la récolte.
Cultures horticoles	75-100 g/hL Effectuez la première application lorsque le système racinaire est bien développé et que les feuilles sont bien développées. Ensuite, tous les 15 jours.

Cultures	Doses Application
Cultures fourragères, industrielles, ornementales et viticulteur	50-75 g/hL 1 à 3 applications depuis le début de la phase de croissance.
APPLICATION RACINE	
Application racine	0,75-1 Kg/Ha Tous les 15 à 20 jours, lorsque la plante a besoin d'une activation racinaire.
Application à prendre racine	1,5 Kg/Ha 2 à 3 applications après la transplantation ou la plantation, chaque semaine.

Dosage général. Application foliaire : 50-100 g/hl par application, pour chaque culture. Application racinaire : 1 kg/ha. Concentration maximale : 1 % (1 kg/hl d'eau).

Cautions: **MARE SOLID** peut être mélangé à toutes les formulations courantes, à l'exception des produits à réaction alcaline, des huiles à base de soufre, des huiles minérales et des émulsions.

EXTRAIT D'ALGUES
tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
1Kg - 2Kg - 5Kg - 10Kg -
20Kg - 500Kg
Plastic bag/Big BagIMPORTÉ
DE L'UE