



**Correcteur
nutritionnel**
Sol / Foliaire



Manganèse, zinc, bore et cuivre

TRIMAX

COMPOSITION

%p/v

Manganèse (Mn)	15,0
Zinc (Zn)	15,0
Cuivre (Cu)	2,0
Bore (B)	2,0

- **MEILLEUR RENDEMENT**
- **AMÉLIORE LA QUALITÉ**
- **PLUS GRANDE TENEUR EN PROTÉINES**

CARACTÉRISTIQUES

TRIMAX est une liquide de micronutriments hautement concentrée et entièrement soluble, conçue pour améliorer la nutrition et la vigueur des plantes. Cette formule à base de micronutriments probiotiques constitue une source stable de cuivre, de manganèse, de bore et de zinc.

TRIMAX assure une absorption optimale du zinc, du manganèse, du bore et du cuivre pour optimiser la nutrition des plantes en micronutriments.

APPLICATIONS

CULTURES		Problème/Objectif :
Céréales	1-1,5 L/ha	Choc, rendement, efficacité de l'azote.
	1-1,5 L/ha	Efficacité de l'azote, performances photosynthétiques, résistance à l'hiver.
	0,5-2 L/ha	Enrichissement des semences en nutriments pour un meilleur développement des jeunes plants. Détails : Au printemps, dès le début de la végétation. En automne, dès le stade 3 feuilles. Traitement des semences.
Pomme de terre	1-2 L/ha	Problème/Objectif : Qualité de la coque, résistance. Détails : 1 à 2 fois depuis le début de la série
Soya	1-1,5 L/ha	Problème/Cible : Performance photosynthétique, résistance, résistance à l'hiver. Détails : 1 à 2 fois à partir du stade 6 feuilles
Maïs	2 L/ha	Problème/Cible : Rendement, performance photosynthétique, résistance. Détails : Dès le stade 4 feuilles.

ACTIONS

- ✓ **AUGMENTE LES NIVEAUX DE CUIVRE, DE MANGANÈSE ET DE ZINC.**
- ✓ **AUGMENTE LA VIGUEUR ET LA QUALITÉ DES CULTURES - DIMINUE LES RISQUES DE MALADIES.**
- ✓ **FORMATION DES GRAINES ET DES GRAINS - FAVORISE LA MATURITÉ.**
- ✓ **SYNTHÈSE DES PROTÉINES.**
- ✓ **AUGMENTE LA TENEUR EN SUCRES - INTENSIFIE LA COULEUR.**
- ✓ **AMÉLIORE LA SAVEUR DES FRUITS ET LÉGUMES.**

CROPS		Problème/Cible :
Colza	1 L/ha	Rendement, performance photosynthétique, résistance, résistance à l'hiver.
	1 L/ha	Rendement, performance photosynthétique, résistance, résistance à l'hiver. Détails : 1 à 2 fois au printemps, du début de la végétation au début de la floraison. En automne, à partir du stade 4 feuilles.
Tournesol	1 L/ha	Problème/Cible : Rendement, résistance photosynthétique. Détails : Dès le stade 4 feuilles.
Betterave à sucre	1 L/ha	Problème/Objectif : Rendement, résistance photosynthétique. Détails : 1 à 2 fois à partir du stade 6 feuilles.

TRIMAX est miscible avec les produits phytosanitaires habituels. Il est toutefois conseillé de réaliser un essai de mélange. Pour les mélanges avec des engrais foliaires ou des produits phytosanitaires, remplir la seringue aux 2/3 d'eau et ajouter les produits individuellement, puis ajouter TRIMAX en dernier. Appliquer immédiatement en remuant constamment.

TRIMAX est stable pendant au moins 2 ans à compter de la date de fabrication. Conserver dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et aéré. **NE PAS conserver en plein soleil.** Tenir à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Tenir hors de portée des enfants.

BIEEN AGITER AVANT UTILISATION !

